

Ekstra ugeopgaver

- [GRP2: 16] *Lad $k = k(\sigma)$ være tallet defineret i GRP(2.18.1), altså som summen $k = \sum (p-1)m_p(\sigma) = n - m(\sigma)$. Som nævnt kan σ skrives som produkt af k transpositioner. Vis, at σ ikke kan skrives som produkt af færre end k transpositioner.
- [TAL3: 17] Lad a, n være to naturlige tal, og lad d være den største fælles divisor for a, n . Der findes da fremstillinger $d = xa - yn$ med hele tal x, y . Vis, at der er et entydigt valg af x, y således, at $1 \leq x \leq n/d$, og at der med dette valg gælder $0 \leq y < a/d$.
- Bestem cykelfremstillingen af $(1\ 2\ 3 \dots n) \cdots (1\ 2\ 3\ 4)(1\ 2\ 3)(1\ 2)$.
- *Bestem cykelfremstillingen af $(1\ 2)(1\ 2\ 3)(1\ 2\ 3\ 4) \cdots (1\ 2\ 3 \dots n)$.
- For primtallene 5, 13 og 17 har vi $5 = 2^2 + 1^2$, $13 = 3^2 + 2^2$, og $17 = 4^2 + 1^2$. Derimod kan 7, 11 og 19 ikke skrives som en sum af to kvadrater. Prøv med nogle flere primtal, og formuler en sætning. *Bevis sætningen.
- For hvilke $n = 2, 3, \dots, 25$ er gruppen af primiske restklasser $(\mathbb{Z}/n)^*$ cyklisk? Prøv eventuelt med nogle flere værdier af n , og formuler en sætning. *Bevis sætningen.
- Lad N være en normal undergruppe af gruppen G . To sideklasser, $A_1 = g_1N$ og $A_2 = g_2N$, er specielt delmængder af G . Produktet A_1A_2 har derfor to definitioner, i GRP(4.1) og i GRP(4.15). Giver de to definitioner samme resultat?
- Findes der 1.000.000 på hinanden følgende ikke-kvadratfrie naturlige tal?
- Bestem antallet af løsninger modulo n til kongruensen $x^2 \equiv 1$.
- [GRP1: 21] *Vis, at en ikke-tom mængde G med en associativ komposition '*' er en gruppe, hvis og kun hvis der for alle $a, b \in G$ gælder, at ligningerne $a * x = b$ og $y * a = b$ har løsninger $x, y \in G$.
- [TAL3: 16] Vis, for $n \geq 3$, at der er uendelig mange primtal p med $p \not\equiv 1 \pmod{n}$.
- [GRP4: 23] *Vis, at der findes uendelig mange primtal p med $p \equiv 1 \pmod{4}$. [Vink: kig på en primdivisor p i $(2p_1 \cdots p_k)^2 + 1$, og anvend GRP(4.17) på $G := (\mathbb{Z}/p)^*$ og et passende g .] (Dirichlet's sætning udsiger mere generelt, at når $(a, n) = 1$, så findes der uendelig mange primtal p med $p \equiv a \pmod{n}$.)
- Er det muligt at dele en terning i 1992 terninger (naturligvis ikke alle af samme størrelse)? [Kilde: Lettisk konkurrence — for 9. klasse! Jeg syntes, den var svær!]
- [GRP7: 22] For en undergruppe H af en endelig gruppe G virker G ved translation på mængden $X = G/H$ af sideklasser. Bestem isotropigruppen for en given sideklasse xH . Bestem kernen for den tilhørende repræsentation $G \rightarrow \text{Perm}(G/H)$.
- [GRP7: 23] Antag, at p er den mindste primdivisor i ordenen af G , og at H er en undergruppe af index p . Vis, at H er normal.
- [RNG1: 20] Kvaternion-enhederne $\mathbf{1}, \mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ tilhører ringen $\text{Mat}_2(\mathbb{C})$. Vis, at matricerne af formen $a\mathbf{1} + b\mathbf{i} + c\mathbf{j} + d\mathbf{k}$, for reelle tal (a, b, c, d) , udgør en delring \mathbb{H} af $\text{Mat}_2(\mathbb{C})$. Vis, at \mathbb{H} er et skævlige.

24. april 2006

17. Vis det omvendte af Wilson's sætning, for $n \geq 2$: Hvis $(n-1)! \equiv -1 \pmod{n}$, så er n et primtal. Hvad med det omvendte af Fermat's sætning?
18. [RNG6: 19] Lad ξ være et (irrationalt) kvadratisk tal med diskriminant D . Vis, for et ulige primtal p , at p er et primelement i $\mathbb{Z}[\xi]$, hvis og kun hvis D modulo p ikke er et kvadrat.
19. Når n er primopløst, $n = p_1^{v_1} \cdots p_r^{v_r}$, er det let at bestemme antallet af (positive) divisorer i n : det er produktet $(v_1 + 1) \cdots (v_r + 1)$. Kan du finde en formel for summen $\sigma(n)$ af divisorerne i n ?
20. Et tal n kaldes *fuldkomment*, hvis n er lig med summen af sine divisorer, fra regnet n selv, altså hvis $\sigma(n) = 2n$. Eksempler: $6 = 1 + 2 + 3$ og $28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14$. Vis (Euklid), at hvis $2^k - 1$ er et primtal, så er $n = 2^{k-1}(2^k - 1)$ fuldkomment. Vis omvendt (Euler), at ethvert lige fuldkomment tal er af denne form. (Man ved ikke om der findes ulige fuldkomne tal.)
21. Bestem modulo 101 en liste med mindst 20 primiske restklasser og deres inverse – på højst 2 minutter. [Vink: prøv at faktorisere 100 og 102.]
22. For antallet $p(n)$ af cykeltyper i S_n (altså partitioner af n) gælder trivielt, at $p(n) = \sum p_h(n)$, hvor $p_h(n)$ er antallet af cykeltyper med h som den mindste længde af en cykel. Øjensynlig er $p_n(n) = 1$ og $p_h(n) = 0$ for $n/2 < h < n$. Vis for $h < n$, at $p_h(n) = \sum_{h \leq k \leq n-h} p_k(n-h)$ og overvej, at dette kan bruges til en rekursiv bestemmelse af $p(n)$.
23. For en permutation $\sigma = (\sigma_1, \dots, \sigma_n)$ (i den direkte notation) bestemmes antallet af inversioner $\ell(\sigma)$ sådan: man gennemløber pladserne, for $i = 1, \dots, n$, og tæller for hver plads i hvor mange gange, der på en senere plads står et tal, der er mindre end det i 'te: $\sigma_j < \sigma_i$. Antag, at $\sigma_k > \sigma_{k+1}$, og lad σ' være permutationen, der (i den direkte notation) fås fra σ ved at ombytte tallene σ_k og σ_{k+1} . Vis, at $\ell(\sigma') = \ell(\sigma) - 1$. Slut heraf, at σ kan skrives som produkt af $\ell(\sigma)$ nabotranspositioner, og specielt, at $\text{sign}(\sigma) = (-1)^{\ell(\sigma)}$.
24. [RNG2: 11] Lad R være en kommutativ ring, og lad \mathfrak{a} være et ægte ideal. Antag, at $R \setminus \mathfrak{a} \subseteq R^*$ (altså at hvert $r \in R$ med $r \notin \mathfrak{a}$ er invertibelt i R). Vis, at R/\mathfrak{a} er et legeme og at \mathfrak{a} er et maksimalideal. Vis, at \mathfrak{a} er det eneste maksimalideal i R .
25. [RNG6: 18] Lad p være et ulige primtal. Vis for hele tal b, c og $D := b^2 - 4c$, at kongruensen $z^2 - bz + c \equiv 0 \pmod{p}$ har løsninger, hvis og kun hvis kongruensen $x^2 \equiv D \pmod{p}$ har løsninger.
26. [RNG6: 20] Afgør om den diofantiske ligning $x^2 + xy - y^2 = 17$ har løsninger.
27. [RNG6: 21] Lad $R = \mathbb{Z}[\xi]$ være en kvadratisk talring med diskriminant D . Vis, at R er euklidisk for $D = -3, -4, -7, -8, -11$. Vis, at R er euklidisk for $D = 5, 13$. Vis, at R er euklidisk for $D = 17$.
28. [GRP4: 24] *Bestem kommutatorundergrupperne S'_n og A'_n . [Vink: For $n \geq 5$ er enhver 3-cykel en kommutator af to 3-cykler. Undersøg også hvad der sker for $n \leq 4$.]
29. [TAL2: 15] En følge af naturlige tal a_1, a_2, a_3, \dots defineres ved forskriften

$$a_n := \lfloor 10^{n-1} \pi / 2 \rfloor \pmod{10^{100} + 1},$$

24. april 2006

hvor $[\alpha]$ er den hele del af det reelle tal α og x mod d betegner den principale rest af x ved division med d . Vis, at $S := \{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ er en begrænset delmængde af \mathbb{N} . Lad m være det mindste tal i S . Vis, at $1 \leq m \leq 2$. Kan du afgøre hvilken af de to muligheder, der indtræffer?

30. *Et berømt resultat af Lagrange udsiger, at ethvert naturligt tal er en sum af fire ikke-negative kvadrater; her må nogle af kvadraterne altså være 0. Angiv eksplicit en funktion $f: \{5, 6, 7, \dots\} \rightarrow \mathbb{N}$ således, at der for ethvert $k \geq 5$ gælder: Hvis $n \geq f(k)$, så er n en sum af k positive kvadrater.

31. [GRP1: 22] *Antag, at G er en mængde med en associativ komposition '*', som har et venstre neutralt element e , dvs $e * x = x$ for alle $x \in G$. Vis, at hvis hvert element x har et venstre invers x' , dvs $x' * x = e$, så er G en gruppe.

Vis, at hvis hvert element x har et højre invers x' , dvs $x * x' = e$, så er G ikke nødvendigvis en gruppe.

Vis, at hvis man ud over eksistensen af højreinverse elementer yderligere antager: af $a * e = b * e$ følger $a = b$, så er G en gruppe.

32. Lad $p(n)$ være antallet af cykeltyper i S_n , altså antallet af partitioner af n , og lad $p_h(n)$ være antallet af typer, hvor længden af den største cykel er h . Øjensynlig er $p(n) = \sum_{h=1}^n p_h(n)$. Vis rekursionsformlen: $p_n(n) = 1$ og for $h < n$ er $p_h(n) = \sum_{k=1}^h p_k(n-h)$.

33. Lad der være givet en bijektiv afbildning $\mu: X \rightarrow Y$. Gør rede for, at hvis σ er en permutation af X , så er ${}^\mu\sigma := \mu\sigma\mu^{-1}$ en permutation af Y . Vis, at hvis σ er produkt af disjunkte cykler $(x_1 \dots x_p)$, så er ${}^\mu\sigma$ produkt af de tilsvarende disjunkte cykler $(\mu(x_1) \dots \mu(x_p))$.

34. [TAL2: 16] Vis, at $1^4 + 2^4 + \dots + n^4 = n(6n^4 + 15n^3 + 10n^2 - 1)/30$.

35. [TAL6: 12] Lad n være et naturligt tal, fremstillet med k cifre i 10-talssystemet. Antag, at n' er fremkommet af n ved ombytning af de k cifre. Vis, at tallet $n - n'$ er deleligt med 9.

36. [TAL3: 18] Et naturligt tal $p > 1$ har følgende egenskab: $p \mid ab \implies p \mid a$ eller $p \mid b$. Vis, at p er et primtal.

37. [TAL2: 17] Vis, at alle naturlige tal n er karakteriseret ved en interessant egenskab. [Vink: brug Velordningsprincippet.]

38. Lad n være et naturligt tal primisk med 10. Vis, at der findes et multiplum af n , som i 10-talssystemet skrives med lutter 1-taller.

39. [TAL3: 19] Antag for naturlige tal a, b, c, d , at $ab = cd$. Vis, at $a \mid c \iff d \mid b$.

40. [TAL3: 20] Antag, at $n \mid ab$ ($n \geq 1$), og sæt $d := (a, n)$. Vis, at $\frac{n}{d} \mid b$ ved at bruge en fremstilling $d = xa + yn$. [Vink: Indsæt fremstillingen i bd .]

41. Antag, at X er en ordnet mængde med n elementer. Vis, at enhver permutation σ af X har en entydig fremstilling som et produkt af følgende form (med $r \geq 0$ transpositioner):

$$(*) \quad \sigma = (i_1 j_1) \cdots (i_r j_r), \text{ hvor } i_s < j_s \text{ for } s = 1, \dots, r \text{ og } j_1 < \dots < j_r.$$

[Vink: For $\sigma = \text{id}$ anvendes den tomme fremstilling ($r = 0$). For $\sigma \neq \text{id}$ kan man lade $j(\sigma)$ betegne det største element, der flyttes af σ . Begrund, at i en fremstilling (*) må der gælde

24. april 2006

$j(\sigma) = j_r$ og $\sigma(i_r) = j_r$, og benyt dette til at vise påstanden ved fuldstændig induktion efter $j(\sigma)$.]

Vis, at $n - r$ er antallet af baner for σ . [Vink: Denne påstand kan medtages i induktionsbeviset for den første påstand.]

42. For $n \geq 0$ kan *Stirling-tallene af første art*, $\left[\begin{smallmatrix} n \\ r \end{smallmatrix} \right]$ for $r = 0, \dots, n$, defineres ved ligningen mellem polynomier:

$$x(x+1) \cdots (x+n-1) = \sum_r \left[\begin{smallmatrix} n \\ r \end{smallmatrix} \right] x^r.$$

Vis, ved at multiplicere parenteserne i produktet, at

$$\left[\begin{smallmatrix} n \\ n-r \end{smallmatrix} \right] = \sum_{1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_r \leq n-1} j_1 j_2 \cdots j_r.$$

Udled heraf, at

$$\left[\begin{smallmatrix} n \\ r \end{smallmatrix} \right] = \text{antallet af permutationer i } S_n \text{ med } r \text{ baner.}$$

43. Lad U_1, \dots, U_k være delmængder af en endelig mængde U . Sæt

$$N_r := \sum_{\{i_1, \dots, i_r\}} |U_{i_1} \cap \dots \cap U_{i_r}|;$$

summen er over alle delmængder med r elementer af indices. Leddet svarende til i_1, \dots, i_r er antallet af elementer $u \in U$, som ligger i alle de r delmængder U_{i_1}, \dots, U_{i_r} (og måske i flere af delmængderne U_i). Lad E_t betegne antallet af elementer $u \in U$, som opfylder $u \in U_i$ for præcis t værdier af i . Specielt er så $N_k = E_k = |U_1 \cap \dots \cap U_k|$, og

$$N_0 = |U|, \quad E_0 = |U \setminus (U_1 \cup \dots \cup U_k)|, \quad \text{og } N_0 - E_0 = |U_1 \cup \dots \cup U_k|.$$

Vis, for $r = 0, \dots, k$, at

$$N_r = \sum_{r \leq t \leq k} \binom{t}{r} E_t; \quad \text{specielt } N_0 = E_0 + \dots + E_k.$$

Vis, at disse ligninger kan udtrykkes som en enkelt ligning mellem polynomierne $N(x) := \sum N_r x^r$ og $E(x) := \sum_r E_r x^r$, nemlig $N(x) = E(x+1)$. Slut heraf, at $E(x) = N(x-1)$, og dermed, at

$$E_r = \sum_{r \leq t \leq k} (-1)^{t-r} \binom{t}{r} N_t.$$

Ligningerne udtrykker princippet om *tælling ved inklusion-eksklusion*. Specielt er

$$E_0 = N_0 - N_1 + \dots + (-1)^k N_k \quad \text{og} \quad N_0 - E_0 = N_1 - N_2 + \dots + (-1)^{k-1} N_k.$$

24. april 2006

44. En farvelægning af $\{1, \dots, n\}$, med farver fra en ordnet mængde F med k farver, er et n -sæt (f_1, \dots, f_n) med $f_i \in F$. Lad U være mængden af farvelægninger og lad U_i være delmængden af farvelægninger, som *ikke* bruger den i 'te farve. Vis, med standardbetegnelser for inklusion-eksklusion, at for $0 \leq r \leq k$ er

$$N_{k-r} = \binom{k}{r} r^n, \quad E_{k-r} = \left\{ \begin{matrix} n \\ r \end{matrix} \right\} k^r.$$

hvor $\left\{ \begin{matrix} n \\ r \end{matrix} \right\}$ er antallet af klassedeling af en mængde med n elementer i r klasser (*Stirling-tallene af anden art*), og $k^{\underline{r}} := k(k-1) \cdots (k-r+1)$. Udled formlerne:

$$k^n = \sum \left\{ \begin{matrix} n \\ r \end{matrix} \right\} k^r, \quad \left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\} = \frac{1}{k!} \sum (-1)^r \binom{k}{r} (k-r)^n,$$

Hvilken ligning mellem polynomier udledes af den første formel?

45. Den symmetriske gruppe S_n virker på farvelægninger (f_1, \dots, f_n) med farver fra en mængde med k farver ved at permutere koordinaterne. Banerne svarer til k -sæt af antal, (a_1, \dots, a_k) , hvor a_j er antallet af koordinater af den j 'te farve. Vis, at Polya's tælleformel er følgende formel:

$$\binom{n+k-1}{n} = \frac{1}{n!} \sum_r \left[\begin{matrix} n \\ r \end{matrix} \right] k^r.$$

Hvilken ligning mellem polynomier udledes af formlen?

[Vink: begge formlens sider kræver en overvejelse. Venstresiden er antallet af heltalsløsninger til $a_1 + \dots + a_k = n$ med $a_j \geq 0$, og på højresiden er koefficienten til k^r lig med antallet af permutationer i S_n med r baner.]

46. I en *partition* $n = \lambda_1 + \dots + \lambda_k$, hvor $\lambda_i \in \mathbb{N}$, skelner man ikke rækkefølgen af leddene, og partitionen kan enten angives ved følgen af addender *altid ordnet aftagende*, $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_k > 0$, eller ved *typen* $1^{m_1} 2^{m_2} 3^{m_3} \dots$, hvor m_1 er antallet af 1-taller blandt λ_i 'erne, m_2 er antallet af 2-taller osv. Fx kan partitionen $18 = 1 + 1 + 3 + 3 + 3 + 3 + 4$ angives som $(4, 3, 3, 3, 3, 1, 1)$ eller som $1^2 3^4 4^1$ (det er et „formelt“ produkt, som *ikke* skal regnes ud).

For en klassedeling af en mængde X med n elementer i k klasser udgør klassernes elementantal en partition $(\lambda_1, \dots, \lambda_k)$, som kaldes klassedelings type. Bemærk, at antallet af klassedeling af en given type $(\lambda_1, \dots, \lambda_k)$ *ikke* er givet ved multinomialkoefficienten,

$$\binom{n}{\lambda_1, \dots, \lambda_k} = \frac{n!}{\lambda_1! \cdots \lambda_k!}.$$

Multinomialkoefficienten ovenfor angiver nemlig antallet af opdelinger af X i *nummerede* delmængder X_1, \dots, X_k med $|X_i| = \lambda_i$; hvis vi, som her, antager at $\lambda_i \geq 1$ for alle i , så fås de nummerede opdelinger blot ved at nummerere klasserne i en klassedeling (under kravet $|X_i| = \lambda_i$). Slut heraf, at det søgte antal klassedeling af en given type $(\lambda_1, \dots, \lambda_k)$

24. april 2006

er bestemt at dividere multinomialkoefficienten med $m_1!m_2!\cdots$. Vis herved: Antallet af klassedeling af den givne type $(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k)$ er bestemt som tallet

$$\frac{n!}{m_1!m_2!\cdots\lambda_1!\cdots\lambda_k!} = \frac{n!}{m_1!m_2!\cdots(1!)^{m_1}(2!)^{m_2}\cdots},$$

og antallet af permutationer i S_n af denne type er bestemt som tallet

$$\frac{n!}{m_1!m_2!\cdots\lambda_1\cdots\lambda_k} = \frac{n!}{m_1!m_2!\cdots 1^{m_1}2^{m_2}\cdots}.$$

47. I en klassedeling af $X = \{1, \dots, n\}$ med k klasser kan man nummerere klasserne X_i sådan, at når h_m er det mindste tal i X_m , så er $h_1 < h_2 < \cdots < h_k$. Øjensynlig er så $h_1 = 1$, og $h_k \leq n$. Følgen h_1, \dots, h_k kan alternativt bestemmes ud fra følgen m_1, \dots, m_k , hvor m_v er antallet af tal h som opfylder $h_v < h < h_{v+1}$ (hvor $h_{k+1} := n + 1$). Overvej nu:

de m_1 tal h med $h_1 < h < h_2$ ligger alle i X_1 ;

de m_2 tal h med $h_2 < h < h_3$ ligger i X_1 eller i X_2 ;

de m_3 tal h med $h_3 < h < h_4$ ligger i X_1 eller i X_2 eller i X_3 ; osv.

Slut heraf, at for en given følge m_1, \dots, m_k er der $1^{m_1}2^{m_2}\cdots k^{m_k}$ muligheder for klassedelingen. Vis herved, at

$$\left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\} = \sum_{m_1+\cdots+m_k=n-k} 1^{m_1}2^{m_2}\cdots k^{m_k} = \sum_{1 \leq j_1 \leq j_2 \leq \cdots \leq j_{n-k} \leq k} j_1 j_2 \cdots j_{n-k}.$$

48. [POL4: 7] *Lad f være et heltalspolynomium. Antag, at konstantleddet er et primtal p , og at de numeriske værdier af de øvrige koefficienter har sum mindre end p . Vis, at f er irreducibel i $\mathbb{Z}[X]$.

49. [TAL6: 13] *En stamme vilde kannibaler fanger 100 matematikere. De skal alle spises, men de får en chance for at slippe fri: De bliver stillet op på en lang række, og alle udstyret med en hat, der er enten rød, gul eller grøn. Den, der gætter farven på sin egen hat, slipper fri. Hver matematiker i rækken kan se de foranstående, men kun høre de bagvedstående. Først gætter den bagerste, så den næstbagerste osv. Matematikerne har på forhånd aftalt en strategi. Hvor mange slipper fri?

50. [TAL6: 14] (Euler's generalisering af Fermat's sætning). Antag, at a er primisk med n . Vis, at $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$. [Vink: Restklassen $A = [a]$ er en primiske restklasse. Derfor er multiplikation med A en bijektiv afbildning af mængden af primiske restklasser på sig selv. Med andre ord: hvis B_1, B_2, B_3, \dots er samtlige primiske restklasser opskrevet i en tilfældig orden, så er AB_1, AB_2, AB_3, \dots igen samtlige primiske restklasser (i en anden orden). Produktet af alle restklasserne B_i er derfor lig med produktet af alle restklasserne AB_i . Heraf følger påstanden.]

51. [TAL6: 15] *(Gauss's generalisering af Wilson's sætning). Lad w være produktet af alle naturlige tal mindre end n og primiske med n . Antag $n > 2$. Vis, at $w \equiv (-1)^{N/2} \pmod{n}$, hvor N er antallet af løsninger modulo n til kongruensen $x^2 \equiv 1 \pmod{n}$. [Vink: Restklassen

24. april 2006

$[w]$ af w er lig med produktet af alle primiske restklasser. For hver primisk restklasse A indgår også den inverse A^{-1} som faktor i w . De to faktorer går ud mod hinanden, med mindre de er den samme, dvs når $A^{-1} = A$, altså når $A^2 = \mathbf{1}$. Derfor er $[w]$ lig med produktet af de restklasser A , som opfylder $A^2 = \mathbf{1}$. I dette produkt forekommer for hver faktor A også restklassen $-A$ som faktor, og den er forskellig fra A , da $n > 2$. Slår vi faktorerne sammen to og to, vi erstatte $A(-A)$ med $A(-A) = -A^2 = -\mathbf{1}$. Heraf fås den ønskede formel.

*Vis, at $w \equiv -1 \pmod{n}$, når $n = 4$ eller $n = p^v$ eller $n = 2p^v$ (et ulige primtal p), og at $w \equiv 1$ i alle andre tilfælde.

52. [GRP6: 14] *Lad G være en endelig kommutativ gruppe, og lad a være produktet af samtlige elementer i G . Vis, at $a = e$, på nær hvis G har præcis ét element af orden 2; og at a i undtagelsestilfældet er det entydigt bestemte element af orden 2.

53. Til en julefrokost deltager 20 personer, som sidder ligeligt fordelt omkring et rundt bord. Hver person har medbragt en pakke og lægger den på bordet foran sig. Under den obligatoriske pakkeleg permuteres pakkerne. Efter pakkelegen er der imidlertid 2 personer, der har fået deres egen pakke.

a. Vis, at man kan dreje bordet således, at ingen får sin egen pakke.

b*. Samme opgave, men hvor kun 1 person har fået sin egen pakke.

c*. Gælder det samme, hvis der er 25 deltagere?

54. Vis, når p er et primtal kongruent med 3 modulo 4, at produktet $((p-1)/2)!$ er kongruent med ± 1 modulo p . *For hvilke p er produktet lig 1?

55. Der gælder $3^2 + 4^2 = 5^2$ og $10^2 + 11^2 + 12^2 = 13^2 + 14^2$, og $21^2 + 22^2 + 23^2 + 24^2 = 25^2 + 26^2 + 27^2$. Ser du systemet? [Vink: Løs for et givet helt tal $n \geq 1$ ligningen herunder.]

$$\overbrace{x^2 + (x+1)^2 + \cdots + (x+n)^2}^{n+1 \text{ kvadrater}} = \overbrace{(x+n+1)^2 + \cdots + (x+2n)^2}^{n \text{ kvadrater}}.$$

56. Vis, at for alle n er $n^{13} \equiv n \pmod{2730}$.