

## **Matematik for geologer**

Opgavesæt til besvarelse på 4 timer.

Alle sædvanlige hjælpemidler er tilladt.

Opgavesættet består af 3 sider med i alt 6 opgaver.

Opgaverne ønskes besvaret med så mange mellemregninger og så megen forklarende tekst, at eksaminandens tankegang træder tydeligt frem.

### **Opgave 1**

(ca. 15 point)

En funktion  $f(x)$  er givet ved

$$f(x) = x^2 - 4x$$

Tegn grafen for  $f$ .

Grafen for  $f$  og  $x$ -aksen afgrænser i 4. kvadrant et område  $M$ .

Bestem arealet af  $M$ .

Bestem rumfanget af det omdrejningslegeme, der fremkommer, når  $M$  drejes  $360^\circ$  om  $x$ -aksen.

**Opgave 2**

(ca. 15 point)

En funktion  $f$  af to variable  $x$  og  $y$  er givet ved

$$f(x, y) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}y^2 + xy + 2$$

Bestem de partielle afledede  $\frac{\partial f}{\partial x}$  og  $\frac{\partial f}{\partial y}$ .

Bestem de stationære punkter for  $f$ .

Bestem en ligning for den tangentplan til grafen for  $f$ , som har røringspunktet  $(2, -1, f(2, -1))$ .

**Opgave 3**

(ca. 15 point)

Vi betragter tre  $2 \times 2$ -matricer  $A$ ,  $B$  og  $C$ :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 12 \end{pmatrix}$$

Begrund hvilke af de tre matricer, der har en invers matrix, og bestem den inverse matrix, hvor det er muligt.

Bestem matricen  $(A + B)C$ .

En lineær afbildung  $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  har matricen  $B$  som afbildningsmatrix:

$$f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

Bestem billedeet af vektoren  $\vec{v} = \begin{pmatrix} 12 \\ 5 \end{pmatrix}$  ved afbildungnen  $f$ .

Bestem koordinatsættet for den vektor  $\vec{u}$ , der afbordes i vek-

toren  $\vec{w} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \end{pmatrix}$ .

**Opgave 4**

(ca. 15 point)

Bestem den fuldstændige løsning til differentialligningen

$$\frac{dy}{dx} = 2x(y - 1)$$

Bestem derefter den løsning, hvis graf indeholder punktet  $P(1, 2e)$ .

**Opgave 5**

(ca. 25 point)

Bestem tallet  $k$ , således at funktionen

$$y = k \cdot e^{2x}$$

er løsning til differentialligningen

$$(1) \quad y'' - 2y' - 35y = 70e^{2x}$$

Løs den tilsvarende homogene ligning

$$y'' - 2y' - 35y = 0$$

Angiv den fuldstændige løsning til ligningen (1).

Bestem den løsning  $f$  til (1), som opfylder  $f(0) = 3$  og  $f'(0) = 5$ .

**Opgave 6**

(ca. 15 point)

I et koordinatsystem i rummet er en linje  $\ell$  givet ved parameterfremstillingen

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix} ; \quad t \in \mathbb{R}$$

Bestem projektionen af punktet  $P(8, -1, 5)$  på linjen  $\ell$ .

Bestem afstanden fra  $\ell$  til punktet  $P$ .

Bestem en ligning for den plan  $\alpha$ , der indeholder punktet  $P$  og linjen  $\ell$ .