

## Matematik H1

### Erhvervsøkonomi-matematik studiet

4 timers skriftlig prøve.

Alle hjælpemidler er tilladt, dog ikke regnemaskiner af nogen art.  
Sættet er på 3 sider og består af 6 opgaver.

#### Opgave 1 (Vægt 15%)

Lad

$$\underline{\underline{A}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 + \alpha \\ 0 & 1 & 1 - \alpha \end{pmatrix}, \quad \underline{u} = \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \underline{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

hvor  $\alpha \in \mathbf{R}$  er en parameter.

- (a) Udregn  $\det \underline{\underline{A}}$ .
- (b) For hvilken værdi af  $\alpha$  tilfredsstiller vektoren  $\underline{u}$  ligningssystemet  $\underline{\underline{A}}\underline{x} = \underline{b}$ ?
- (c) Lad  $\alpha$  variere frit. Bestem den fuldstændige løsning til ligningssystemet  $\underline{\underline{A}}\underline{x} = \underline{b}$ .

#### Opgave 2 (Vægt 20%)

Lad

$$f(x, y) = x^3 + xy^2 - 6x^2 - 36x.$$

- (a) Bestem de første ordens partielle afledede samt Hesse matricen  $\underline{\underline{H}}(x, y)$  for  $f$  i ethvert punkt  $(x, y)$ . Udregn endvidere determinanten af  $\underline{\underline{H}}(x, y)$ .
- (b) Funktionen  $f$  har 4 stationære punkter. Bestem disse, og afgør typen af hvert af dem.
- (c) Betragt cirkelskiven

$$S = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 36\}.$$

Begrund, at  $f$  antager både en mindste og en største værdi i  $S$ . Bestem disse værdier og samtlige punkter, hvori de antages.

- (d) Betragt dernæst området

$$A = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 \mid x \geq 3, |y| \leq 3\}.$$

Vis, at  $\det \underline{\underline{H}}(x, y) \geq 0$  for alle  $(x, y) \in A$ , og vis desuden, at  $f$  er konveks i dette område.

**Opgave 3** (Vægt 10%)

Lad  $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$  og  $g: \mathbf{R}^4 \rightarrow \mathbf{R}^4$  være de lineære afbildninger givet ved matricerne, henholdsvis

$$\begin{pmatrix} -1 & 6 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{og} \quad \begin{pmatrix} -1 & 6 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

(a) Bestem en basis for  $\mathbf{R}^2$ , hvori  $f$  repræsenteres af en diagonalmatrix. Angiv også denne diagonalmatrix.

(b) Bestem ligeledes en basis for  $\mathbf{R}^4$ , hvori  $g$  repræsenteres af en diagonalmatrix, og angiv denne diagonalmatrix.

**Opgave 4** (Vægt 25%)

Lad vektorerne  $\underline{a}_1, \underline{a}_2, \underline{a}_3, \underline{a}_4$  i talrummet  $\mathbf{R}^4$  være givet ved

$$\underline{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \underline{a}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad \underline{a}_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ 8 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \underline{a}_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 0 \\ 8 \end{pmatrix}.$$

Lad endvidere  $f: \mathbf{R}^4 \rightarrow \mathbf{R}^4$  være den lineære afbildning, hvis matrix har disse vektorer som søjler (i den angivne rækkefølge).

(a) Vis, at sættet  $\underline{a}_1, \underline{a}_2$  udgør en ortogonal basis for billedrummet  $f(\mathbf{R}^4)$ . Vis, at  $\underline{a}_1$  og  $\underline{a}_2$  er egenvektorer for  $f$ , og angiv de tilhørende egenverdier.

(b) Begrund ved hjælp af dimensionsætningen, at dimensionen af  $\ker f$  er 2. Vis dernæst, at vektorerne

$$\underline{b}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \underline{b}_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

tilhører  $\ker f$  og udgør en ortogonal basis for dette underrum.

(c) Vis, at sættet  $\underline{a}_1, \underline{a}_2, \underline{b}_1, \underline{b}_2$  udgør en ortogonal basis for  $\mathbf{R}^4$ . Bestem matricen for  $f$  med hensyn til denne basis (benyt søjlereglen).

(d) Bestem koordinattransformationsmatricen for overgangen fra den naturlige basis  $\underline{e}_1, \underline{e}_2, \underline{e}_3, \underline{e}_4$  til den ortonormale basis  $\frac{1}{3}\underline{a}_1, \frac{1}{3}\underline{a}_2, \frac{1}{3}\underline{b}_1, \frac{1}{3}\underline{b}_2$ .

(e) Lad

$$\underline{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Bestem  $\underline{u} \in f(\mathbf{R}^4)$  og  $\underline{v} \in \ker f$  således at  $\underline{x} = \underline{u} + \underline{v}$ . Bestem desuden en vektor  $\underline{w} \in \mathbf{R}^4$  for hvilken  $f(\underline{w}) = \underline{u}$ .

### Opgave 5 (Vægt 15%)

Lad

$$F(x, y) = x^a y - a \ln(xy), \quad (x, y > 0)$$

hvor  $a$  er en konstant,  $a \neq 1$ . Det oplyses (og skal ikke eftervises), at ligningen  $F(x, y) = 1$  fastlægger  $y$  som en to gange differentiabel funktion af  $x$  i nærheden af punktet  $x_0 = 1$ , med værdien  $y_0 = 1$  i dette punkt. Vis, at denne implicit givne funktion har vandret tangent i  $x_0$ , og afgør for hver værdi af  $a$  (dog undtaget  $a = 1$ ), om der er lokalt maksimum eller lokalt minimum i  $x_0$ .

### Opgave 6 (Vægt 15%)

Lad funktionerne  $f, g, h: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}$  være givet ved

$$f(x, y, z) = x + 2y, \quad g(x, y, z) = x^2 + y^2 + xy, \quad h(x, y, z) = y + z.$$

Betragt problemet, at bestemme maksimum og minimum for  $f$  under bibetingelsen

$$\begin{cases} g(x, y, z) = 1 \\ h(x, y, z) = 1. \end{cases}$$

Det oplyses (og skal ikke bevises), at mængden af punkter  $(x, y, z)$ , der opfylder bibetingelsen, er lukket og begrænset.

Opstil Lagrangefunktionen  $\mathcal{L}$ , der svarer til ekstremumsbestemmelsen, og løs derefter problemet. Angiv foruden ekstremumsværdierne også de punkter, hvori ekstremum antages, samt de tilhørende værdier af Lagrange multiplikatorerne.