

## Matematik H1

### Erhvervsøkonomi-matematik studiet

4 timers skriftlig prøve

Alle hjælpemidler er tilladte, dog ikke regnemaskiner af nogen art.  
Sættet er på 3 sider og består af 6 opgaver.

#### Opgave 1 (20 points)

I  $\mathbb{R}^4$  er der givet 5 vektorer

$$\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{a}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$$
$$\mathbf{b}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \\ 7 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Betragt underrummene  $U = \text{span}(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3)$  og  $V = \text{span}(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2)$  i  $\mathbb{R}^4$ .

- (1) Bestem baser for underrummene  $U$  og  $V$ .
- (2) Bestem en ortogonal basis for  $U$ .
- (3) Vis, at  $U$  og  $V$  er komplementære underrum i  $\mathbb{R}^4$ .
- (4) Afgør, om  $V$  er det ortogonale komplement til  $U$  i  $\mathbb{R}^4$ .

- (5) Beregn projektionen af  $\mathbf{c} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix}$  på  $U$  langs  $V$ .

#### Opgave 2 (10 points)

Skriv permutationen  $\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 2 & 4 & 1 & 3 & 6 & 7 & 5 \end{pmatrix}$  som sammensætning af naboombytninger og beregn fortegnet  $\text{sign } \pi$ .

**Opgave 3** (20 points)

For  $t \in \mathbb{R}$  betragtes følgende  $3 \times 3$ -matrix

$$\underline{\underline{C}}(t) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -1 & 3-t & t \\ 2 & t & -t \end{pmatrix}.$$

- (1) For hvilke værdi(er) af  $t$  er

$$\det \underline{\underline{C}}(t) = 0?$$

- (2) Vis, at  $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$  er en egenvektor for  $\underline{\underline{C}}(t)$  for alle  $t \in \mathbb{R}$  og beregn den tilhørende egenværdi.

- (3) Bestem et reelt tal  $a$ , således at  $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$  er en egenvektor for  $\underline{\underline{C}}(a)$  og beregn den tilhørende egenværdi.

- (4) I resten af opgaven sættes  $\underline{\underline{A}} = \underline{\underline{C}}(2)$ .  
Angiv en ortogonal  $3 \times 3$ -matrix  $\underline{\underline{S}}$  således, at

$$\underline{\underline{S}}\underline{\underline{A}}\underline{\underline{S}}^{-1} = \underline{\underline{D}}$$

er en diagonal matrix.

- (5) Afgør om den til  $\underline{\underline{A}}$  hørende kvadratiske form er positiv definit.

**Opgave 4** (20 points)

Lad  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  være givet ved

$$f(x, y) = x^3 - 2xy + y^2 - x.$$

- (1) Beregn de stationære punkter for  $f$ .  
(2) Afgør for hvert stationært punkt, om der er tale om et lokalt maksimum, om et lokalt minimum eller om et saddepunkt for funktionen.

Opgave 4 fortsættes på side 3

- (3) Gør rede for, at  $f$  er strengt konveks i området

$$A = \left[\frac{1}{2}, 2\right] \times [0, 2].$$

- (4) Gør rede for at  $f$  antager en største- og mindste værdi i området  $A$ , og bestem disse værdier.  
VINK: Du kan med fordel udnytte punkt (3).

### Opgave 5 (15 points)

Ligningen

$$(*) \quad (x - 1)y - e^{x(y+z)} + z = 2$$

bestemmer  $z$  som en differentiabel funktion  $z = f(x, y)$  i nærheden af punktet  $(x, y, z) = (0, 1, 4)$ .

- (1) Beregn de partielle afledede af  $f(x, y)$  af første orden i punktet  $(x, y) = (0, 1)$ .
- (2) Angiv ligningen for tangentplanen til den flade  $F$ , der er bestemt ved (\*), i punktet  $(0, 1, 4)$ .

### Opgave 6 (15 points)

Det oplyses at nedenstående problem har en løsning:

$$\begin{aligned} \text{minimer} \quad & (x - 4)^2 + (y - 4)^2 + (z - 1/2)^2 \\ \text{under bibetingelsen} \quad & x^2 + y^2 = z. \end{aligned}$$

- (1) Brug Lagranges metode til at finde løsningen til problemet.
- (2) Gør rede for, at det tilsvarende maksimeringsproblem ikke har en løsning.